

# 머시론® 정 MERCILON®

일반의약품



[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분·데소게스트렐(EP)-----0.15mg
- 에티닐에스테트라디올(EP) 0.02mg
- 동물유래성분·유당수화물(소·우유)
- 첨가제·감자전분, 디엘알파토코페롤, 스테아르산, 콜로이달실리카, 포비돈

## [성상] 흰색의 원형정제

## [효능·효과] 피임

## [용법·용량]

## 1. 복용 방법

정제는 매일 대략 같은 시간에, 물과 함께, 포장에 표시된 순서대로 복용해야 한다. 1일 1정씩 21일간 복용하고, 7일간 휴약(복용 중지)한 후 새로운 포장을 시작한다. 7일이 휴약(복용 중지) 기간 동안 보통 소스성 출혈이 나타나는데, 대개 마지막 정제 복용 후 2~3일에 시작되며, 새로운 포장을 시작하기 전에 끝나지 않을 수 도 있다.

## 2. 복용 시작 방법

- 1) 지난 달 호르몬 피임제를 사용 안 한 경우  
정제 복용은 여성의 자연 주기의 첫 날(즉, 월경의 첫 날) 시작해야 한다. 2~5일째에 시작할 수 있지만, 첫 번째 주기 동안 정제 복용 처음 7일간은 차단피임법(예: 콘돔)을 병행해야 한다.
- 2) 복합호르몬피임제복합경구(먹는)피임제(COC), 질링 또는 경피파취제)에서 바꾸는 경우  
가능하면 기존 복용하던 복합경구(먹는)피임제의 마지막 유효성분 정제(주성분이 포함된 마지막 정제)를 복용하는 다음 날 이 약의 복용을 시작하되, 둘째도 기준 복용하던 복합경구(먹는)피임제의 통상적인 휴약(복용 중지) 기간이나 마지막 위약(숙임약, 모양약, 혀약) 정제 복용 다음 날 이 약의 복용을 시작해야 한다. 질링이나 경피파취제를 사용한 경우에는 가능하면 제거한 날 이 약의 복용을 시작하되, 둘째도 이 제제들(질링이나 경피파취제)의 다음 사용 예정일에는 이 약의 복용을 시작해야 한다. 만약 이전의 피임법을 지속적으로 정확하게 사용해왔고 임신상태가 아님을 분명하다면, 기존의 복합호르몬피임제 복용 주기 중 어느 날이나 이 약으로 바꿀 수 있다. 이전 피임법의 휴약(복용 중지) 기간은 권장된 기간을 절대로 넘겨선 안된다.
- 3) 프로게스틴 단일제제(정제, 주사제, 임플란트) 또는 프로게스틴 유리 자궁내 피임장치(IUS)에서 바꾸는 경우  
프로게스틴정제 복용 중 어느 날이나(임플란트 또는 프로게스틴 유리 자궁내피임장치의 경우 제거한 날, 주사제의 경우 다음 주사 예정일에) 이 약으로 바꿀 수 있다. 그러나 이 모든 경우에 처음 7일간은 차단피임법(예: 콘돔)을 병행해야 한다.
- 4) 임신 첫 3개월 내에 유산 후  
즉시 복용을 시작할 수 있다. 그런 경우, 부가적인 피임법을 병행할 필요는 없다.
- 5) 분만 후 또는 임신 4~6개월 사이에 유산 후  
수유부는 사용상의 주의사항 7. 일부 및 수유부에 대한 투여항목을 참조한다. 분만 후 또는 임신 4~6개월 사이에 유산 후 21일~28일 사이에 복용을 시작할 수 있다. 더 늦게 복용을 시작할 경우, 복용 후 첫 7일 동안 차단피임법을 병행해야 한다. 그러나 성관계가 이미 이루어진 경우에는 임신이 되지 않았음을 확인하고 복합경구(먹는)피임제의 복용을 시작하거나 첫 월경 기간까지 기다려야 한다.

## 3. 복용을 잊었을 경우

- 1) 복용할 시간 12시간 이내인 경우  
피임효과는 유지된다. 생각난 즉시 1정을 복용하고 평상시대로 정해진 시간에 다음 정제를 복용한다.
- 2) 복용할 시간 12시간이 경과한 경우  
피임효과가 감소될 수 있으므로 다음의 두 가지 원칙에 따라 아래의 지시대로 따른다.

- (1) 정제 복용을 중단한 기간이 7일을 넘어서는 안 된다.
- (2) 시상하부-뇌하수체-난소-축이 적절히 억제되지 위해서는 7일간 지속적으로 복용해야 한다.

## • 1주

생각난 즉시 잊은 마지막 정제를 복용한다. 이 때에 한꺼번에 2정을 동시에 복용할 수도 있다. 그리고 평상시대로 정해진 시간에 다음 정제를 복용한다. 복용 후 첫 7일 동안 콘돔과 같은 차단피임법을 병행해야 한다. 만약 이전 7일 동안에 성관계가 이루어졌을 경우 임신의 가능성이 있다. 복용을 잊은 약의 수가 많아지고 복용을 잊은 시점이 정상적인 휴약(복용 중지) 기간에 가까울수록 임신의 위험성은 높아진다.

## • 2주

생각난 즉시 잊은 마지막 정제를 복용한다. 이 때에 한꺼번에 2정을 동시에 복용할 수도 있다. 그리고 평상시대로 정해진 시간에 다음 정제를 복용한다. 첫 번째 정제를 잊기 직전 7일 동안 저속적으로 이 약을 복용했다면, 추가적인 피임방법을 병행하지 않아도 된다. 그러나 그렇지 않은 경우 또는 복용을 잊은 정제가 두 정 이상인 경우, 복용 후 첫 7일간 추가적인 피임을 병행해야 한다.

## • 3주

휴약(복용 중지) 기간이 가까워지기 때문에 피임효과가 감소될 위험성이 높다. 그러나 다음의 지시대로 정제 복용 스케줄을 조절하면 피임 효과와 감소를 막을 수 있다. 첫 번째 정제를 잊기 직전 7일 동안 저속적으로 이 약을 복용했다면, 다음의 두 가지 방법 중 하나를 선택함으로써 추가적인 피임방법을 병행할 필요가 없다. 그렇지 않은 경우에는 다음의 두 가지 방법 중 첫 번째 방법을 따르고, 첫 7일 동안 추가적인 피임방법을 병행해야 한다.

- (1) 생각난 즉시 잊은 마지막 정제를 복용한다. 이 때에 한꺼번에 2정을 동시에 복용할 수도 있다. 그리고 평상시대로 정해진 시간에 다음 정제를 복용한다. 현재의 포장이 끝나자마자 휴약(복용 중지) 기간 없이 다음 포장의 투약을 시작해야 한다. 두 번째 포장의 정제 복용이 끝날 때까지 소토성 출혈이 나타나지 않을 수 있으며, 정제를 복용하는 동안 팬티 출혈(파일럿 출혈) 또는 점상 출혈(출혈점)이 나타날 수 있다.
- (2) 현재의 포장에서 약을 복용하는 것을 중단하고 복용을 잊은 날을 포함하여 7일 동안 휴약(복용 중지) 기간을 가진 후 새로운 포장에서 복용을 시작한다. 복용을 잊고 조정된 스케줄을 시작한 이후 첫 번째 정상적인 휴약(복용 중지) 기간 동안 소토성 출혈이 나타나지 않고 주기를 연장할 때처럼 두 번째 포장을 복용하는 동안 팬티 출혈(파일럿 출혈) 및 점상 출혈(출혈점)을 경험할 위험성이 높아진다.

## 4. 위장장애에 있는 경우의 조언

만약 심한 위장장애의 경우에는 흡수가 완전하게 되지 않을 수 있으므로, 추가적인 피임대책을 취해야 한다. 이 약의 복용 후 3~4시간 내에 구토가 나타나 경우 추가적인 약 복용이 필요하며 복용 방법은 "3. 복용을 잊었을 경우" 항에 따른다.

만약 정상적인 복용 스케줄을 계속 유지하고 싶다면, 추가로 복용을 해야 하는 약은 다른 새 포장에서 필요한 여분의 정제를 복용하면 된다.

## 5. 주기 to 변경하거나 연장할 경우

주기를 연장시키기 위해서는 휴약(복용 중지) 기간 없이 이 약의 새 포장을 순서대로 복용한다. 두 번째 포장을 다 복용할 때까지 일하는 기간만큼 연장할 수 있다. 연장 기간 동안 팬티 출혈(파일럿 출혈) 또는 점상 출혈(출혈점)을 경험할 수 있다. 그런 다음 7일간의 휴약(복용 중지) 기간 후 이 약의 복용을 정상적으로 다시 시작한다.

현재의 일정이 아닌 다른 날로 주기를 변경하기 위해서는 일하는 날짜만큼 추가로 휴약(복용 중지) 기간을 줄일 수 있다. 휴약(복용 중지) 기간이 짧아질수록 소토성 출혈이 나타나지 않고 주기를 연장할 때처럼 두 번째 포장을 복용하는 동안 팬티 출혈(파일럿 출혈) 및 점상 출혈(출혈점)을 경험할 위험성이 높아진다.

## [사용상의 주의사항]

## 1. 경고

흡연은 경구피임제로 인한 심각한 심혈관계 부작용(혈전증 등)의 위험성을 증대시키며 이 위험성은 나이와 흡연량(1일 15개비 이상)에 따라 증가되고 특히 35세 이상의 여성에게 현저하게 나타나므로 경구피임제를 투여하는 여성은 흡연을 삼간다. 또한 35세 이상 흡연자는 이 약을 투여해서는 안된다.

## 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

복합호르몬피임제는 아래에 언급된 어느 조건에 해당되는 경우에도 사용하면 안 된다. 복합호르몬피임제를 사용 중에 청음으로 아래에 언급된 증세가 나타나면 즉시 사용을 중단해야 한다.

## 3) 정맥 혈전증(심부정맥혈전증, 평동맥생선증) 환자나 그 병력이 있는 환자

## 4) 혈관변성증(중증·심한 증상) 당뇨병·중증(심한 증상) 고지혈증,

## 5) 고지혈증·혈관경증·포르피린증 등의 중증(심한 증상) 대사장애 환자

## 6) 정맥 또는 동맥 혈전증이 중증(심한 증상)이거나 복합위험요소가 있는 경우 (5. 일반적 주의 참조)

## 7) 움직이지 못하는 상태가 오래 지속되는 대수술

## 8) 중증(심한 증상) 과증성지방혈증으로 인한 체중(이자) 열이나 그 병력이 있는 환자

## 9) 각 기능이 정상으로 돌아오지 않은 중증(심한 증상) 간질환 환자나 그 병력이 있는 환자

10) 간종양환자(양성이나 악성)나 그 병력이 있는 환자

11) 노하수체 종양 환자

12) 성스테로이드로 인한 악성증양(예: 생식기나 유방)으로 알려져거나 의심되는 환자

13) 진단되지 않은 절 출혈 환자

14) 임부 또는 임신이 의심되는 경우

15) 임신 중 지속적인 가려움, 임신포진(물집), 유천포창(類天疱瘡) 또는 이경화증의 병력이 있는 환자

16) 이 약의 주성분이나 부형제에 과민반응이 있는 경우

17) C형 간접 직접 작용 항바이러스제(Direct-acting antiviral, DAA) 투여 환자(5. 일반적 주의 참조)

18) 이 약은 유당(포당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(포당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포드당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적이 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

19) 선천성 또는 후천성 고종(고종) 고종증(hypercoagulopathies) 환자

20) 35세 이상 흡연자

## 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

## 1) 흡연자

## 2) 고혈압 환자

## 3) 비만자

4) 40세 이상의 여성(일반적으로 혈전증 등의 심혈관계 장애가 발생하기 쉬운 나이다)

## 5) 간질환자

## 6) 페도통 환자

7) 동맥질환의 가족력이 있거나 정맥류의 병력이 있는 환자

8) 전신성 흥분(불온·반점성) 성루푸스 환자

9) 우방암의 가족력이 있는 환자

10) 우울증 및 그 병력이 있는 환자

11) 심신부전 환자

12) 비전형과 고다증식된 유선병증 환자

13) 우방성 질점(여러 부위의 병력) 있는 환자

14) 심근경색(심근경색, 폐색전증, 혈액상승, 정맥류 악화)

15) 고지혈증의 가족력이 있는 환자

16) 당뇨(슬기질질환 및 당석증)의 병력이 있는 환자

17) 자궁내막증 환자

18) 천식 또는 기미 환자

19) 말초혈액증 환자

20) 당뇨 환자

## 4. 이상반응

1) 심혈관계: 혈전증, 정맥성 혈전증, 혈전성 혈전증, 동맥성 혈전증, 뇌졸증, 뇌출혈, 뇌혈관경증, 심근경색, 폐색전증, 혈액상승, 정맥류 악화

2) 비뇨생식계: 월경이출혈(점상출혈·출혈점), 파고성출혈(월경량 변화, 무월경, 경증남부판화증, 자궁근증·기미·폐종·기증·자궁경부 미란(자궁증), 질간디디증, 질염·경증경증증, 우방증, 혈액성부종증, 철혈구(파괴성)·여독증·후군·월경고장)

3) 유방: 유방기장감 및 활대, 유루증(눈물흘림), 유방통 양성유선병증, 유방압통(누르는 통증), 유방분비물

4) 소화기계: 구역, 구토, 복부(배부분)·복부(복부분)·팽만감, 복부(배부분)·경련, 위장장애, 담즙(슬기질분비, 무통·침설·간염, 담즙분비증·슬기질증)·경련·황달, 악취 및 앙상·간증·양(복동증)으로 치명적 복부(배부분)·출혈이 생길 수 있다, 푸르피린증, 만성염증성 질환, 복통(배·부기), 거려움·두드러기·지루·조모증·탈모·발진

7) 눈: 시각장애, 각막질점을 변화, 콘택트렌즈에 대한 감수성 이상, 망막혈전증, 시신경염

8) 귀: 청각장애

9) 대사: 나트륨 및 체액저류(고임·쌓임), 내당능 감소, 당뇨병, 고트리글리세리드혈증, 고콜레스테롤혈증

10) 기타: 층증변화, 식욕변화, 성욕변화, 언어장애, 드물게 프로락틴성 뇌하수체증양 (때때로 유루증(눈물흘림)이 나타남), 과민반응

## 5. 일반적 주의

아래에 언급된 상태/위험 인자 중 어떠한 것이라도 존재하는 상황이라면 복합호르몬피임제 사용을 통한 혜택은 각 개별 여성의 위험 가능성을 염두에 두고 판단해야 하며 사용을 개시하기 전에 해당 여성과 논의되어야 한다. 아래의 상태 및 위험 인자 중 어떠한 것이라도 악화되거나 최초로 나타나는 경우에는 의사와 상담해야 한다. 차후 의사의 복합호르몬피임제 사용을 중단할지 여부를 결정해야 한다.

## 1) 순회기계 이상

- 복합호르몬피임제 사용과 심근 경색, 뇌졸증, 심정맥 혈전증, 폐색전증 등과 같은 동맥 및 정맥의 혈전증 또는 혈전색전증에 대한 위험 증가의 연관성을 보이는 역학 결과가 발표되었다. 이를 질점으로는 드롭을 발생한다.


- 복합호르몬피임제 사용은 심정맥 혈전증 및/또는 폐색전증으로 나타나는 정맥 혈전증·위험 증가와 관련되어 있다. 여성은 복합호르몬피임제를 사용하는 차 해에 위험도가 가장 높다. 이러한 위험성은 4주 이상의 휴약(복용(사용)중) 기 이후 복합호르몬피임제의 사용을 재시작한 후에도 증가한다.

- 일부 역학 연구에서는 저용량 복합경구피임제를 레보노르게스트렐·프로게스틴과 병용하는 것과 비교하여 저용량 복합경구피임제를 데소게스트렐과 같은 3세대 프로게스틴과 병용하는 경우 정맥 혈전색전증 위험성이 증가하였다는 결과가 제시되었다. 이를 연구에서 정맥 혈전색전증은 복용 여성 10,000명당 1년 간 1·2건 증가(으로 별도로 발생하는 위험도가 약 2배 증가하였다) 하지마. 다른 연구에서는 이러한 2배의 위험도 증가가 관찰되지 않았다.

- 저체적으로 복합호르몬피임제를 사용하지 않은 여성의 정맥 혈전색전증 발생률이 10,000명당 연간 1·5건의 것에 비해 저용량 에스트로겐(<0.05 mg 에티닐에스테트라디올) 복합호르몬피임제 사용자의 정맥 혈전색전증 발생률은 여성 10,000명당 연간 3·12건이다. 복합호르몬피임제 사용 중 정맥 혈전색전증 발생률은 임신과 관련된 발생률(여성 10,000명당 연간 5·20건)보다 낮다. 정맥 혈전색전증의 발생률 중 1·2%에서는 치명적이다.

- 아래의 그림은 임신하지 않았으며 복합호르몬피임제를 사용하지 않는 여성, 복합호르몬피임제를 사용하는 여성, 임신한 여성 및 출산 후 여성에 대한 정맥 혈전색전증 발생에 대한 위험성을 나타냈다.

- 정맥 혈전색전증의 발생 가능성



- 가족력(즉, 비교적 이론 연령(나이)대에 부모 또는 형제/자매에서 정맥성 혈전색전증이 발생한 경우) 유전적인 소인이 의심되는 경우 호르몬성피임제 사용을 결정하기 전에 전문가의 조언을 구해야 한다.
  - 비만(체질량 지수 30 kg/m<sup>2</sup> 초과)
  - 이상지질단백질증
  - 고혈압
  - 편두통
  - 심장 판막 질환
  - 심방 세동(간질증)
  - 저수증인 운동 불능 상태, 대수술, 하지(다리) 수술 또는 증증(심한 증상) 이상, 이와 같은 경우 복합경구피임제 사용을 중단하고 수술을 계획하고 있는 경우에는 최소 수술 4주 전에 미리 중단하고 운동 기능이 완전히 회복된 후 2주 뒤에 사용을 재개하는 것이 바람직하다[2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 항 참조].
  - 정맥성 혈전색전증에서 정맥류성 정맥과 표재성(표면에 있는) 혈전성 정맥염의 역할에 관해서는 아직 합의된 바가 없다.
  - 산후 경(출산후) 증 혈전색전증 위험 증가를 반드시 고려해야 한다[7. 임신 및 수유부에 대한 투여 참조].
  - 순환기계 부작용과 관련된 기타 의학적 상태에는 당뇨병, 전신성 흉부(붉은 반점) 성 루푸스, 용혈성(적혈구 파괴성) 요독증후군, 만성 염증성 장 질환(크론씨 병 또는 궤양성 대장염, 경상 적혈구 질환 등)이 있다.
  - 복합경구피임제 사용 중 편두통 발생 비도 증가 또는 정도 증가(뇌혈관 이상 발생의 전구증상일 수 있다.)는 복합경구피임제 사용의 즉각적인 사용 중단 사유가 될 수 있다.
  - 정맥 또는 동맥 혈전증의 유전성 또는 후천성 소인을 나타내는 생화학적 인자에는 활성 C 단백(ACP) 저항성, 혈모스테인(고밀도 콜레스테롤), 햄토 루빈Ⅲ 결핍, 단백질 S 결핍, 항이지진 형체(항카드뮴 리피 형체, 루푸스 항응고체)가 포함된다.
  - 위험 대비 혜택을 고려할 때 의사의 적절한 치료를 통해 혈전증 관련 위험을 줄일 수 있음을 고려해야 한다.
  - 35세 이상의 여성은 복합경구피임제 투여 시작 전에 심혈관계 질환 또는 정맥혈전색전증의 위험을 증가시킬 수 있는 기저 위험요인(예: 고혈압, 당뇨, 이상지질증, 비만)을 고려해야 한다.
- 2) 종양
- 자궁 경부암과 관련된 가장 중요한 위험 인자는 이 유두종 바이러스(HPV)의 지속적 감염이다. 역학 연구 결과 복합경구피임제를 장기간 사용함으로써 이러한 위험이 증가되거나 사설이 제시되었다. 하지만 이러한 사실이 자궁 경부 스크리닝 증가 및 차단 피임법 사용을 포함하는 성 생활의 변화와 같은 고관련성이 기인하는지는 또는 인과관계가 있는지에 대해서는 아직 명확하지 않다.
  - 54건의 역학 연구를 대상으로 수행된 메타 분석에서는 현재 복합경구피임제를 사용하고 있는 여성에서 유방암 진단의 상대 위험도가 약간 증가한다고(Relative Risk = 1.24) 보고하였다. 이 위험도 증가분은 복합경구피임제 사용 중단 후 10년 동안 점차 사라진다. 40세 이하 여성에서는 유방암이 드물기 때문에 유방암의 첫 척도 위험도에 비하여 현재 및 최근 복합경구피임제 사용자에서의 유방암 진단 증가분은 작은 편이다. 이들 연구에서는 원인에 대한 증거를 제공하고 있지는 않다. 관찰된 위험도 증가는 복합경구피임제 사용자에서의 초기 유방암 진단에 따른 일수도 있고 복합경구피임제의 생물학적 효과 때문일 수도 있으며 두 요인이 복합적으로 관여했을 수도 있다. 복합경구피임제를 한 번이라도 사용한 적이 있는 사용자에서 진단된 유방암은 비사용자에서 진단된 유방암에 비해 임상적으로 진행이 덜 되어있는 경향성을 보인다.
  - 복합경구피임제 사용자에서 드물게 양성 간 증양이 보고되었으며 아주 드물게 악성 간 증양이 보고되었다. 개별 사례에서, 이들 종양은 치명적인 복강내 출혈을 야기하기도 하였다. 복합경구피임제 복용 여성에서 증증(심한 증상) 상부 복통(배아픔), 간 비대 또는 복강내 출혈 증후가 발생하면 감별 진단에서 간 증양을 고려해야 한다.
- 3) C형 간염
- 워너터스비르/파리타프레비르/리토나비르 복합제로 수행한 C형 간염 바이러스 환자 임상 연구에서, ALT 수치 상승이 정상최고치(ULN) 대비 5배 이상 나오는 빈도가 복합경구피임제와 같은 에티닐에스트라디올 험유 제제를 사용하는 여성에게서 유의적으로 높게 나타났다. 이 약은 워너터스비르/파리타프레비르/리토나비르 복합제 투여를 시작하기 전에 복용을 중단하여야 한다[2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 및 6. 상호작용 참조]. 이 약은 위 복합요법의 종료 후 약 2주가 경과하였을 때 재복용할 수 있다. 글레카프레비르/파브렌타스비르 복합제를 포함하는 C형 간염 항바이러스제와 에티닐에스트라디올 험유 복합경구피임제 복용(함께 복용(사용)) 투여시 ALT 상승이 관찰되었다.
- 4) 기타 상태
- 고증상 방혈증 여성 또는 가족력이 있는 여성의 경우 복합경구피임제 사용 시 퀘장(이자) 염 위험이 증가할 수 있다.
  - 복합경구피임제를 복용하는 많은 여성에서 약간의 혈압상승이 보고되었지만 임상적으로 관계된 증가는 드물었다. 복합경구피임제의 사용과 고혈압의 관계는 확립되지 않았다. 하지만, 복합경구피임제 사용 중 임상적으로 유의한 고혈압이 자속적으로 나타나면 의사의 복합경구피임제 복용을 중단시키고 고혈압을 치료하는 것이 현명하다. 항고혈압 치료를 통해 혈압이 정상이 되면 적절하다고 여기질 때 복합경구피임제 사용을 재개할 수 있다.
  - 임신과 복합경구피임제 사용으로 다음과 같은 상태가 발생되거나 악화된다거나 보고되었지만, 복합경구피임제 사용과의 관련성에 대한 증거는 아직 명확하지 않았다. 홀달 및/또는 담즙율(설계율/정체율)과 관련된 소양증(가려움증), 담석 형성, 포르피리증, 전신성 흥분(붉은 단점, 루푸스, 용혈성(적혈구 파괴성) 요독증후군, 시판해 무도병(Sydenham's chorea), 임신성 포진(물집), 이경화증 관련 청각 상실, (유전성 및 후천성) 헬관부종(부기))
  - 간 기능의 급성 및 만성 장애로 인해 간 기능 수치가 정상으로 되돌아올 때까지 복합경구피임제 사용을 중단할 필요가 있을 수 있다. 임신 중 또는 기존 성 스테로이드 사용 중 최초로 발생했던 담즙(쓸개즙) 정체성 황달이 재발하는 경우 복합경구피임제 사용을 중단할 필요가 있다.
  - 복합경구피임제가 말초 인슐린 저항성 및 포도당 내성에 영향을 미칠 수는 있지만 (에피닐에스트라디올이 0.05 mg 미만으로 들어있는) 저용량 복합경구피임제를 사용하는 당뇨병 환자의 치료로 노요법을 변경해야 한다는 증거는 없다. 하지만, 당뇨병 여성의 경우 복합경구피임제 복용 중 주의 깊은 관찰이 필요하다.
  - 크론씨 병 및 궤양성 대장염은 복합경구피임제 사용과 관련이 있다.
  - 특히 임신성 기미를 경험했던 여성의 경우 때로 기미가 발생할 수 있다. 기미 경향이 있는 여성의 경우 복합경구피임제 복용 중 태양광 및 자외선 노출을 피해야 한다.
  - 우울증이 복제력을 저지른 여성에게 경구피임제를 투여할 경우 주의를 기울여야 하며, 우울증이 심하게 재발하면 투여를 중단하고 우울증이 경구피임제의 투여와 연관된 것인지지를 확인하기 위해 대처적 피임방법을 사용하도록 한다.
  - 피임법의 선택에 대해 상담할 때 위의 모든 정보를 고려해야 한다.
  - 운전이나 기계 사용 능력에 대한 효과는 관찰되지 않았다.
  - 조절되지 않은 이상지질증증 환자는 대체 피임법을 고려해야 한다. 이 약은 이상 지질 변화를 일으킬 수 있다.
  - 이 약에 포함된 에스토로겐 성분은 갑상선-결합 글로불린(thyroid-binding globulin), 성호르몬-결합 글로불린(sex hormone-binding globulin) 및 코르티솔-결합 글로불린(cortisol-binding globulin)의 혈중 농도를 증가시킬 수 있다. 갑상선 호르몬 또는 코르티솔 대체요법 시 용량 증가가 필요할 수 있다.
- 5) 의학 검사/상담
- 이 약의 부용을 시험 또는 재개하기 전에 완전한 병력(가족력 포함)을 확보해야 하며, 임신은 반드시 배제되어야 한다. 혈압은 측정해야 하며, 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 및 "5. 1일전적 주의" 부문을 참조하여 임상적 징兆가 있을 경우 신체 검사를 수행해야 한다. 여성에게는 이 약의 설명서를 주의 깊게 읽고 권고사항을 따르도록 시사해야 한다. 추가적인 정기 검사의 빈도와 특성은 확립된 진료가이드라인에 기초하여 개별 여성에 적용되어야 한다.
  - 여성에게 경구피임제가 HIV 감염(AIDS) 및 기타 전염성 성병을 예방하지 못함을 알려주어야 한다.
- 6) 효능 감소
- 복합경구피임제의 효능은 정제 복용을奕거나(용법용량 "3. 본용을奕었을 경우" 참조), 위장 장애(용법용량 "4. 위장장애 경우의 조언" 참조) 또는 대체계스트렐의 활성 대사체인 에토노게스트렐의 혈중 농도를 감소시키는 약물의 복용(함께 복용(사용)) 투여(6. 상호작용 참조) 등으로 인해 감소할 수 있다.
- 7) 주기 조절 감소
- 모든 복합경구피임제와 마찬가지로 특히 사용 처음 몇 개월간 불규칙한 출혈(점성 출혈/출혈점) 또는 패턴(파열성 출혈)이 발생할 수 있다. 따라서 모든 불규칙 출혈에 대한 경가는 약 3 주기의 적응 기간 이후에만 의미를 지닌다. 불규칙한 출혈이 지속되거나 기존에 규칙적이던 주기 이후 불규칙한 출혈이 발생하는 경우에는 호르몬과 관련 없는 원인을 고려해야 하며 암 또는 임신 가능성을 배제하기 위한 적절한 진단 조치를 취해야 한다. 이에는 소파슬(죽어버림술)이 포함될 수 있다. 일부 여성(출산 후 유(복용 중지) 기간 동안 소퇴성 출혈이 발생하지 않을 수 있다. 용법·용량에 따라 복합경구피임제를 복용하였다면서 여성이 임신했을 가능성이 낮다. 하지만 용법용량에 따라 경구피임제를 복용하지 않은 경우에는 복합경구피임제를 계속 사용하기 전에 반드시 임신 가능성을 고려해야 한다.
8. 상호작용
- 경구피임제와 다른 약물과의 상호 작용으로 인해 패턴(파열) 성 출혈 및/또는 경구피임제가 발생할 수 있다. 다음과 같은 상호 작용이 문헌에 보고되었다.
- 간대사: 마이크로솜 효소, 특히 Cytochrome P450 효소(CYP) 유도 약물과의 상호 작용이 발생하여 성 호르몬의 청소율이 증가하여 혈증농도가 감소할 수 있으며, 이는 이 약을 포함한 경구피임제의 효능을 감소시킬 수 있다.(예: 페니토인, 히드로토인, 바른비탈케(페노바비탈), 프리미돈, 보센단, 카르바마제핀, 리팜피신, 리파부틴, 옥스카르비제핀, 토피라미이트, 펠바메이트, 그리세오플빈, 루피나미드, 아프레피탄트, 일부 HIV 프로테이제 저해제(억제제)(예: 리토나비르), 비누클레오사이드우사체 억제효소 억제제(NNRTI), 예: 에파비렌즈), 세인트존스풀(St. John's wort)을 포함한 생약. 효소 유도는 치료 며칠 후에 나타날 수 있다.
- 일반적으로 최대 효소 유도는 몇 주 내로 관찰된다. 치료 중단 후, 효소 유도는 28일 까지 지속될 수 있다.
- 호르몬 피임약과의 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 다음의 HIV프로테이제 저해제 (억제제)감소(예: 네팔피나비르, 리토나비르, 디루나비르/리토나비르, (포스) 암프레나비르/리토나비르, 로피나비르/리토나비르, 티프라나비르/리토나비르) 또는 증가(예: 인디나비르, 아티나비르/리토나비르) 또는 비뉴클레오사이드 억제효소 억제제(NNRTI), 감소(예: 네비라핀) 또는 증가(예: 에트라비린) 또는 C형 간염 바이러스 프로테이제 저해제(억제제)감소(예: 보세프레비르, 텔라프레비르) 가 대소계스트렐의 활성대사체 에토노게스트렐을 포함하는 프로게스틴 또는 에스토로겐의 혈중 농도를 증가시킬 수 있다. 이러한 변화가 가져오는 효과와의 합은 일부 사례와 임상적 연관이 있을 수 있다. 위 각 효소 유도 약제 또는 한방 요법 중 어느 하나라도 치료를 받는 여성은 이 약의 효과가 감소할 수 있음을 조언받아야 한다. 간 효소 유도 약제 병용(함께 복용(사용)) 투여 기간 중 및 투여 중단 후 28일까지 치료 고법제를 투여하여 사용해야 한다. 효소 유도 약제로 장기간 치료받는 여성은 효소 유도 약제의 영향을 받지 않는 대체 피임법을 고려해야 한다.

2) 에티닐에스트라디올을 함유한 복합경구피임제와 이토노게스트렐 또는 로수버스스타틴을 복용(함께 복용(사용)) 투여하면 에티닐에스트라디올의 AUC가 약 20-25% 증가한다. 아스코르보산 및 아세트아미노펜은 에티닐에스트라디올의 혈증 농도를 증가시킬 수 있다. 강력한 또는 중증도의 CYP3A 저해제(억제제)(예: 케토코나졸, 이트로코나졸, 클라리스로마이신, 블루나졸, 딜티아제, 에리소스로마이신, 보리코나졸, 자몽주스)와의 병용(함께 복용(사용)) 투여는 에스트로겐, 또는 대소계스트렐의 활성 대사체인 에토노게스트렐을 포함하는 프로게스틴의 혈증 농도를 증가시킬 수 있다.

3) 경구피임제는 다른 약제의 대사에 영향을 줄 수 있다. 따라서, 혈장 및 조직 농도가 증가하거나 예: 사이클로스포린, 프레드니솔론, 치오플린, 티자니딘, 보리코나졸) 또는 감소할 수 있다(예: 라모트리진, 아세트아미노펜, 모르핀 살리실산, 테마제팜). 라모트리진 혈증 농도가 유의하게 감소하면 백작 조절이 감소할 수 있으므로 라모트리진 흡강 조절이 필요할 수 있다. 갑상선 호르몬 또는 코르티코스테로이드 대체요법으로 치료 중인 여성은 복합경구피임제 사용으로 갑상선-결합 글로불린(thyroid-binding globulin) 및 코르티손-결합 글로불린(cortisol-binding globulin)의 혈증 농도가 증가할 수 있으므로 갑상선 호르몬 또는 코르티솔 용량 증가가 필요할 수 있다.

4) 음비타스비르/파리타프레비르/리토나비르 복합제로 수행한 C형 간염 바이러스 환자 임상 연구에서, ALT 수치 상승이 정상최고치(ULN) 대비 5배 이상 나오는 빈도가 20-25% 증가한다. 아스코르보산 및 아세트아미노펜은 에티닐에스트라디올의 혈증 농도를 증가시킬 수 있다. 강력한 또는 중증도의 CYP3A 저해제(억제제)(예: 케토코나졸, 이트로코나졸, 클라리스로마이신, 블루나졸, 딜티아제, 에리소스로마이신, 보리코나졸, 자몽주스)와의 병용(함께 복용(사용)) 투여는 에스트로겐, 또는 대소계스트렐의 활성 대사체인 에토노게스트렐을 포함하는 프로게스틴의 혈증 농도를 증가시킬 수 있다.

5) 경구피임제는 대상능동을 감소시키고 인슐린 또는 혈당강하제의 요구를 증가시킬 수 있다.

6) β-단자단(메토프롤론 등), 벤조디아제핀과 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 이 약물의 작용이 강화되고 연장될 수 있다.

7) 모다피닐과 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 치료기간 및 치료중지 이후 주기 동안 효소유도로 피임효과를 감소시킬 수 있다.

8) 플루나리진과 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 유루증(눈물흘림)이 나타날 수 있다.

9) 디ализ 제거제(bile acid sequestrant)인 폴리세브리움과 복합경구피임제를 함께 투여하면 에티닐에스트라디올의 AUC가 유의하게 감소한다. 복합경구피임제의 에스트로겐 성분이 혈증 농도가 감소하면 잠재적으로 피임 효과 감소 또는 비생리기 자궁 출혈이 발생할 수 있다. 복합경구피임제와 콜레세브리움 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 4시간 이상 간격을 두고 따로 투여한다.

10) 잠재 상호 작용 가능성을 파악하기 위해 복용(함께 복용(사용)) 약제의 처방 정보를 참조해야 한다.

7. 일부 및 수유부에 대한 투여

1) 이 약은 임신 기간 중 사용하지 않는다. 이 약 사용 중 임신이 발생하면 복용을 바로 중단해야 한다. 하지만 대부분의 역학 연구 결과 임신 전 복합경구피임제 사용 여성에서 태어난 아이의 선천성 기형 위험은 증가하지 않았으며 임신 초기 부주의로 복합경구피임제를 복용하였을 때에도 기형 발생 위험성이 증가하지 않았다. 출산 후에 이 약의 복용을 재시작할 때에는 정맥 혈전색전증의 위험성이 증가할 수 있음을 고려해야 한다.(사용설의 주의사항 5. 1일전적 주의 항 참조)

2) 임신 검사로서 위축 출혈을 유도하기 위해 복합경구피임제를 사용하는 안된다. 임신 중 절박 유산 또는 습관성 유산을 치료하기 위해 복합경구피임제를 사용에서는 안된다.

3) 이 약 성분 중 일부 종이 모유 중에 이행되어 영아에게 활달 및 유방확대 등 부작용이 보고된 바 있고 모유의 양과 질을 저하시킬 수 있으므로 수유부에는 투여하지 않는다.

8. 과량투여

과양 투여로 인한 심각한 유해 효과는 보고되지 않았다. 이 경우 발생할 수 있는 증상에는 구역, 구토 및 어린 소녀의 경우 경미한(가벼운, 대수롭지 않은) 질 출혈 등이 있다. 해독제는 없으며 차후 치료는 증상에 따라 이루어져야 한다.

9. 임상검사치에의 영향

경구피임제는 다음과 같이 내분비 및 간기능 시험과 혈액 내용물에 영향을 미칠 수 있다.

1) 프로트롬бин 및 용고인자 VII, VIII, IX, X의 증가, 향트롬빈 III 감소 노르에피네프린으로 인한 혈소판 응집성의 증가

2) 컬럼 분석 또는 방사선면 혈액분석에 의한 T4 농도 및 갑상선-결합 글로불린(TBG) 증가에 의해 대체계스트렐의 혈증 농도가 감소하면 잠재적으로 피임 효과 감소 또는 비생리기 자궁 출혈이 발생할 수 있다. 복합경구피임제와 콜레세브리움 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 4시간 이상 간격을 두고 따로 투여한다.

3) 혈청 중 다른 결합단백질의 증가

4) 성호르몬 결합성 글로불린의 증가로 인한 혈액 종의 순환하는 성스테로이드 및 코르티코이드 종량의 증가(비결합성 또는 활성 농도에는 변화 없음)

5) 혈청 트리글리세리드 증가

6) 내내동 감소

7) 혈청 혈액농도 감소

8) 메티라폰 시험에 대한 반응성 감퇴

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온보관, 제조일로부터 36개월(3년)

[포장단위] 21정

[취급상의 주의사항]

1. 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우 해당약국이나 의약품판매인자를 통하여 교환하여 드립니다.

2. 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

3. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

수입자 알보렌코리아주식회사  
충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 55-8  
소비자상담: 02-2047-7700  
\* 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조자 Cydea Pharma, S.L.  
Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Ágreda, 31, Olvega 42110(Soria), (Spain)  
판매자 (주)종근당 서울시 서대문구 충정로 8

첨부문서 개정년월일: 2020년 06월 12일  
이 첨부문서의 작성일(2020년 06월 12일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) → [의약품정보]-[의약품제품정보]란에서 확인할 수 있습니다.